

春夏にんじん管理台帳(2024年)

項目	調査内容			
(1)氏名	島原市有明町の 久田		(2)管理番号	
(3)播種日	1月 20日		(4)収穫予定	5月 下旬
(5)品種	①向陽2号 ②愛紅 ③彩豊 ④翔彩 ⑤その他()			
(6)畑の字名	下道輪		(7)面積	22a
(8)畑の標高(m)	①0~19 ②20~39 ③40~59 ④60~79 ⑤80~99 ⑥100~119 ⑦120~139 ⑧140~159 ⑨160~179 ⑩180~199 ⑪200~219 ⑫220~239 ⑬240~259 ⑭260~279 ⑮280~299 ⑯300~			
(9)作型	①トンネル+マルチ ②トンネル ③バオバオ+マルチ ④マルチ ⑤ベタロン ⑥その他()			
(10)被覆ビニール	①一年目 ②二年目 ③三年目 ④その他()			
(11)マルチ	①透明 ②シーダー黒 ③マルチ無し ④その他()			
(12)条数	①10条 ②8条 ③6条 ④その他()			
(13)株間	①5cm ②6cm ③7cm ④8cm ⑤10cm ⑥その他()cm			
(14)前作物	①冬にんじん ②秋冬だいこん ③しょうが ④サトイモ ⑤水稻 ⑥その他()			
(15)肥料	①人参特裁 袋 ②キャロットオール8 袋 ③人参特号 10 袋 ④BM苦土 袋 ⑤セルカ 袋 ⑥ヒフクH30 袋 ⑦パワー苦土セルカ 10 袋 ⑧マルチサポート 袋			
(16)				

出荷予定数量
kg
確認者印

※該当する欄に○印を記入下さい。
※圃場別に必ず記入下さい。

	薬剤名	対象病害虫	使用倍数	使用時期	RACコード	成分(系統)	総使用回数	散布月日					
								1	2	3	4	5	6
除 草 剤	クリアター細粒剤F	1年生雑草	全面土壌散布4~5kg/10a	は種直後 (雑草発生前)	[H]15/3/5	(カーバメイト/ジニトロ アニリン/尿素)	※1	/	/	/	/	/	/
	ゴーゴーサン細粒剤F	1年生雑草	全面土壌散布4~5kg/10a	は種直後 (雑草発生前)	[H]3	(ジニトロアニリン)	※1	/	/	/	/	/	/
	ワンクロスWG	1年生雑草	全面土壌散布 200~250ml/水100L/10a	にんじん3~5葉期、 但し収穫30日前まで (雑草生育期)	[H]1/5	(アミノキシプロピオン酸 エステル/尿素)	1	/	/	/	/	/	/
	ロロックス	1年生雑草	全面土壌散布 100~200g/水70~150L/10a 全面土壌散布 100~150g/水70~150L/10a	は種直後 にんじん3~5葉期、 但し収穫30日前まで (雑草発生期)	[H]5	(尿素)	1	/	/	/	/	/	/
土 壌 殺 虫 剤	バイデール粒剤	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ	全面土壌混和20~ 50kg/10a	は種前	[I]1A	オキサミル (カーバメイト)	1	/	/	/	/	/	/
	ビーラム粒剤	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ	全面土壌混和20kg/10a	は種前	[I]7	フルオピラム(アミド)	1	/	/	/	/	/	/
	ネマキック粒剤	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ	全面土壌混和15kg/10a	は種前	[I]1B	イミシアホス(殺線虫)	1	/	/	/	/	/	/
	テロン	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ/ 功本ミミズ幼虫	15~20L/10a	作付10~15日前	[I]8A	D-D(殺線虫)	1	/	/	/	/	/	/
殺 菌 剤	ユニフォーム粒剤	しみ腐病 根腐病	全面土壌混和9~18kg/10a 全面土壌混和6~18kg/10a	は種前	[F]11/4	(ストロビルリン/アミド)	1	/	/	/	/	/	/
	ヨネボン水和剤	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病	500	7日	[F]M1	(有機銅)	4	/	/	/	/	/	/
	カスミンボルドー	黒葉枯病/軟腐病/斑点細菌病	1000	14日	[F]24/M1	(抗生物質/無機)	2	/	/	/	/	/	/
	ストロビーフロアブル	黒葉枯病 斑点病	2000~3000 3000	7日	[F]11	(ストロビルリン)	3	/	/	/	/	/	/
	ダコニール1000	黒葉枯病	1000	7日	[F]M5	TPN(その他の合成)	※5	/	/	/	/	/	/
	アミスターオブティフロアブル	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病/菌核病/しみ腐病	1000	21日	[F]11/M5	アジキストロン/TPN(ストロビルリン/その他の合成)	※2	3	10	/	/	/	/
	ベルコートフロアブル	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病/菌核病	1000	14日	[F]M7	(その他の合成)	5	/	/	/	/	/	/
	ポリオキシンAL水和剤	黒葉枯病	500	7日	[F]19	(抗生物質)	5	/	/	/	/	/	/
	キノドーフロアブル	黒葉枯病	600~800	3日	[F]M1	有機銅	5	/	/	/	/	/	/
	ICボルドー66D	黒葉枯病	50~100	-	[F]M1	塩基性硫酸銅(無機)	-	/	/	/	/	/	/
	ロブラール水和剤	黒葉枯病/斑点病	1000~1500	14日	[F]2	イプロブオン (ジカルボキシミド)	4	/	/	/	/	/	/
	トリフミン水和剤	うどんこ病	3000	前日	[F]3	(ステロール生合成阻害)	3	/	/	/	/	/	/
	シグナムWDG	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病	2000	14日	[F]11/7	ピラジロキニル/ホスカリド(ストロビルリン/アミド)	2	/	/	/	/	/	/
	セイビアーフロアブル20	菌核病	1000	7日	[F]12	フルジオキシニル (その他の合成)	3	/	/	/	/	/	/
								/	/	/	/	/	/
殺 虫 剤	フォース粒剤	ネキリムシ類	全面土壌混和4~12kg/10a	は種前	[I]3A	テフルリン(ピレスロイド)	1	/	/	/	/	/	/
	ガードバイトA	ネキリムシ類	株元散布 3kg/10a	生育初期、 但し収穫2日前	[I]3A	ヘルメリン(ピレスロイド)	5	/	/	/	/	/	/
	ネキリエースK	ネキリムシ類	土壌表面株元処理 3kg/10a	発芽期~生育初期、 但し収穫14日前まで	[I]1B	インキサチオン (有機リン)	4	/	/	/	/	/	/
	ゼンターリ顆粒水和剤	ハスモンヨトウ/オオタバコガ ヨトウムシ	1000 1000~2000	発生初期 (但し前日まで)	[I]11A	BT(生物農薬)	-	/	/	/	/	/	/
	エコマスターBT	ヨトウムシ/ハスモンヨトウ /オオタバコガ	1000	発生初期 (但し前日まで)	[I]11A	BT(生物農薬)	-	/	/	/	/	/	/
	マラソン乳剤	キアゲハ/アブラムシ類/ ヤサシノウムシ	2000~3000	14日	[I]1B	マラソン(有機リン)	4	/	/	/	/	/	/
	アファーム乳剤	ハモグリバエ類	2000	前日	[I]6	(マクロライド)	3	/	/	/	/	/	/
	フェニックス顆粒水和剤	ヨトウムシ	2000~4000	前日	[I]28	(ジアミド)	2	/	/	/	/	/	/
	ランネット45DF	ヨトウムシ/ハスモンヨトウ /アブラムシ類	1000	前日	[I]1A	メソミル(カーバメイト)	2	/	/	/	/	/	/
	スピノエース顆粒水和剤	ハモグリバエ類	5000	3日	[I]5	スピノサド(スピノシン)	3	/	/	/	/	/	/
	カスケード乳剤	ヨトウムシ	4000	3日	[I]15	フルフェクスロン (昆虫成長阻害)	2	/	/	/	/	/	/
	プレオフロアブル	ハスモンヨトウ	1000	前日	[I]UN	ピリダリル (その他の合成)	2	/	/	/	/	/	/
	ディアナSC	ハスモンヨトウ	2500~5000	前日	[I]5	スピネトラム (スピノシン)	2	/	/	/	/	/	/
	アクセルフロアブル	ハスモンヨトウ/ヨウタンゾウムシ類	1000	前日	[I]22B	メタフルミゾン (その他の合成)	3	/	/	/	/	/	/
	コテツフロアブル	ヒョウタンゾウムシ類/ヨトウムシ/キアゲハ	2000	前日	[I]13	クロルフェナビル (その他の合成)	2	/	/	/	/	/	/
	ベネビアOD	アブラムシ類 ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	2000 4000	前日	[I]28	(ジアミド)	3	/	/	/	/	/	/

※上記薬剤以外を使用される場合は、空欄に記入願います。
登録内容が変更になる場合がありますので、使用に当たっては、ラベルをよく確認して下さい。

住所