

項 目		調 査 内 容					
(1)	氏 名	吉 田 幸 春		(2)	管 理 番 号		
(3)	播 種 日	8 月 15 日		(4)	収 穫 予 定	11 月 中 旬	
(5)	品 種	① 向陽2号 ② 翔馬 ③ <u>紅ひな</u> ④ 愛紅 ⑤ らいむ ⑥ 夏晴き彩豊 ⑦ その他()					
(6)	畑 の 字 名	中野野		(7)	面 積	11a	
(8)	畑 の 標 高 (m)	① 0~19 ② 20~39 ③ <u>40~59</u> ④ 60~79 ⑤ 80~99 ⑥ 100~119 ⑦ 120~139 ⑧ 140~159 ⑨ 160~179 ⑩ 180~199 ⑪ 200~219 ⑫ 220~239 ⑬ 240~259 ⑭ 260~279 ⑮ 280~299 ⑯ 300~					
(9)	う ね 幅	① 40cm ② 45cm ③ 50cm ④ 55cm ⑤ <u>60cm</u> ⑥ その他() cm					
(10)	株 間	① 5cm ② <u>6cm</u> ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 10cm ⑥ その他() cm					
(11)	緑 肥 作 物	① ソルゴー ② エン麦 ③ ネマキング ④ コブトリソウ ⑤ その他()					
(11)	前 作	① スイートコーン ② 春だいこん ③ <u>春にんじん</u> ④ 春はくさい ⑤ かぼちゃ ⑥ すいか ⑦ その他()					
(12)	堆 肥	① 鶏糞 トン ② 牛糞 2 トン ③ 豚糞 トン ④ 腐食の柱 袋 ⑤ その他 <u>大地王 0.14トン</u>					
(13)	肥 料	① キャロット888 袋 ② 人参特号 7 袋 ③ パワー苦土セルカ 2 袋 ④ BM苦土重焼燐 2 袋 ⑤ セルカ 袋 ⑥ スペシャル30 袋 ⑦ マルチサポート 袋 ⑧ その他					
(14)							

※該当する欄に○印を記入下さい。
※圃場別に必ず記入下さい。

出荷予定数量

kg

確認者印

	薬剤名	対象病害虫	使用倍数	使用時期	RAC コード	成分(系統)	総使用 回数	散布月日					
								1	2	3	4	5	6
除 草 剤	クリアター細粒剤F	1年生雑草	全面土壌散布4~5kg/10a	は種直後 (雑草発生前)	[H]15/3/5	(カーバメイト/ジニ トロアニリン/尿素)	※1	/					
	ゴーゴーサン細粒剤F	1年生雑草	全面土壌散布4~5kg/10a	は種後出芽前 (雑草発生前)	[H]3	(ジニトロニリン)	※1	8/16					
	ワンクロスWG	1年生雑草	全面土壌散布 200~250g/水100L/10a	にんじん3~5葉期、但 し収穫30日前まで(雑 草発生前)	[H]1/5	(アフルオキシプロピ オン酸エステル/尿素)	1	/					
	ロロックス	1年生雑草	全面土壌散布 100~150g/水70~150L/10a	にんじん3~5葉期、但 し収穫30日前まで(雑 草発生前)	[H]5	(尿素)	1	/					
土 壌 殺 虫 剤	バイデートL粒剤	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ	全面土壌混和20~50kg/10a	は種前	[I]1A	オキサミル (カーバメイト)	1	/					
	ビーラム粒剤	ネコブセンチュウ	全面土壌混和10~20kg/10a	は種前	[I]7	フルボラム(7ミト)	1	/					
	ネマキック粒剤	ネコブセンチュウ	全面土壌混和15kg/10a	は種前	[I]1B	イミシアホス(殺 線虫)	1	/					
	テロン	ネコブセンチュウ/ネグサレセンチュウ /コナシシシシシシシ	15~20L/10a	作付10~15日前	[I]8A	D-D(殺線虫)	1	/					
殺 菌 剤	ユニフォーム粒剤	しみ腐病	全面土壌混和9~18kg/10a	は種前	[F]11/4	(ストロビン/メタ ラキシル)	1	/					
	ヨネボン水和剤	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病	500	7日	[F]M1	(無機化合物)	4	/	/	/	/	/	/
	カスミンボルドー	黒葉枯病/軟腐病/斑点病 菌病	1000	7日	[F]24/M1	(抗生物質/無機)	2	10/30	/				
	ストロビーフロアブル	黒葉枯病	2000~3000	7日	[F]11	(ストロビルリン)	3	/	/	/	/	/	/
	ダコニール1000	黒葉枯病	1000	7日	[F]M5	TPN(その他の合成)	※5	9/3	/	/	/	/	/
	アミスターオブティフロアブル	黒葉枯病/斑点病/うどん こ病/菌核病/しみ腐病	1000	21日	[F]11/M5	アノキストロビン /TPN	※2	/	/				
	ベルコートフロアブル	黒葉枯病/斑点病/うどん こ病/菌核病	1000	14日	[F]M7	(その他の合成)	5	9/25	/	/	/	/	/
	ポリオキシシンAL水和剤	黒葉枯病	500	7日	[F]19	(抗生物質)	5	/	/	/	/	/	/
	キノドーフロアブル	黒葉枯病	600~800	3日	[F]M1	有機銅	5	/	/	/	/	/	/
	ICボルドー66D	黒葉枯病	50~100	-	[F]M1	塩基性硫酸銅(無機)	-	/	/	/	/	/	/
	ロブラール水和剤	黒葉枯病/斑点病	1000~1500	14日	[F]2	イプロロン (ジカルボキシド)	4	/	/	/	/	/	/
	トリフミン水和剤	うどんこ病	3000	前日	[F]3	(ステロール生合成 阻害)	3	/	/	/	/	/	/
	シグナムWDG	黒葉枯病/斑点病/うどんこ病	2000	14日	[F]11/7	ピラジロストロビン/ボス カド	2	/	/	/	/	/	/
	セイビアーフロアブル20	菌核病	1000	7日	[F]12	フルジオキシニル (その他の合成)	3	/	/	/	/	/	/
殺 虫 剤	フォース粒剤	ネキリムシ類	全面土壌混和4~12kg/10a	は種前	[I]3A	フルリン(ピレスロイド)	1	/					
	ガードベイトA	ネキリムシ類	株元散布 3kg/10a	生育初期、 但し収穫7日前	[I]3A	フルリン(ピレスロイド)	5	/	/	/	/	/	/
	ネキリエースK	ネキリムシ類	土壌表面株元処理 3kg/10a	発芽期~生育初 期、但し収穫14日 前まで	[I]1B	イソキサチオン (有機リン)	4	/	/	/	/	/	/
	ゼンターリ顆粒水和剤	ハスモンヨトウ/オオタバコガ	1000	発生初期 (但し前日まで)	[I]11A	BT(生物農薬)	-	/	/	/	/	/	/
	エコマスターBT	ヨトウムシ/ハスモンヨトウ /オオタバコガ	1000	発生初期 (但し前日まで)	[I]11A	BT(生物農薬)	-	/	/	/	/	/	/
	マラソン乳剤	キアゲハ/アブラムシ類/ ヤサシゾウムシ	2000~3000	14日	[I]1B	マラソン(有機リン)	4	/	/	/	/	/	/
	アファーム乳剤	ハモグリバエ類/ハスモン ヨトウ	2000	前日	[I]6	(マクロライド)	3	9/3	/	/	/	/	/
	フェニックス顆粒水和剤	ヨトウムシ	2000~4000	前日	[I]28	(ジアミド)	2	/	/	/	/	/	/
	スピノース顆粒水和剤	ハモグリバエ類	5000	3日	[I]5	スピノサド(スピノシン)	3	/	/	/	/	/	/
	カスケード乳剤	ヨトウムシ	4000	3日	[I]16	フルフェクスロ (昆虫成長阻害)	2	/	/	/	/	/	/
	ブレオフロアブル	ハスモンヨトウ	1000	前日	[I]UN	ピリダリル (その他の合成)	2	9/25	/	/	/	/	/
	ディアナSC	ハスモンヨトウ	2500~5000	前日	[I]5	スピノトラム (スピノシン)	2	/	/	/	/	/	/
	アクセルフロアブル	ハスモンヨトウ/ヒョウタンゴウムシ類	1000	前日	[I]22B	メタフルミゾン (その他の合成)	3	/	/	/	/	/	/
	アクセルベイト	ネキリムシ類/ハスモンヨトウ	株元散布 3~6kg/10a	前日	[I]22B	メタフルミゾン (その他の合成)	3	/	/	/	/	/	/
	コテツフロアブル	ヒョウタンゴウムシ類/ヨト ウムシ/キアゲハ	2000	前日	[I]13	クロルフェナピル (その他の合成)	2	/	/	/	/	/	/
	ベネビアOD	アブラムシ類	2000~4000	前日	[I]28	(ジアミド)	3	/	/	/	/	/	/
	グレースィア	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	4000					10/30	/	/	/	/	/

※上記薬剤以外を使用される場合は、空欄に記入願います。

登録内容が変更になる場合がありますので、使用に当たっては、ラベルをよく確認して下さい。

住所